



pbserum Specific **Periocular**

Esquema de tratamiento
para rejuvenecimiento de periocular

pbserum Specific

Triple Sinergia Enzimática

- **Renueva el colágeno** y elastina, libera los factores tróficos y protege frente a radicales libres.
- **Sistema de enzimas** e ingredientes activos, fácil de usar y con tratamiento en casa para maximizar resultados en **5 indicaciones**.
- **Experiencia médica** e **investigación** transformada en una solución para la reparación y el rejuvenecimiento de la piel.



Professional

Home Care

Perfil del paciente recomendado



Género: Hombres y Mujeres



Edad: 25 a 60 años

Indicado para pacientes que presenten **arrugas finas** en la zona **periocular**, coloración en la zona de la ojera y festón malar.



Se sugiere iniciar el tratamiento en pacientes con **buen estado de salud física y psíquica**, sin contraindicaciones asociadas al uso de enzimas recombinantes o sus ingredientes activos.

Protocolo de tratamiento

Professional



1ra sesión



2da sesión



3ra sesión

Día 0

Día 60

Home Care

Aplicación diaria durante el periodo del tratamiento



Professional

Aplicación:



Specific es un producto versátil de aplicación transdérmica, con la técnica preferida del médico.

Protocolo recomendado:

Considerando la aplicación sugerida con microneedling



Profundidad :

Párpado superior 0.25 mm

Párpado inferior y zona periorcular: 0.5 mm



Seguir vectores lineales, y hacer mínimo 2 pases por zona. Aplicar 2.5 ml en zona periorcular derecha y 2.5 ml en zona periorcular izquierda



Frecuencia y Número de Sesiones

Se recomienda un mínimo de 3 sesiones con una separación de 21 días.

Home Care

Aplicación:



Aplicar **1 ml** del producto por las **noches** sobre la zona periorcular limpia, sustituyendo la rutina nocturna habitual, durante **2 meses** para maximizar los resultados con un tratamiento completo.

Se puede **continuar** con la **rutina habitual** de **cuidado de la piel** por las mañanas.

Se recomienda el uso de protector solar con **SPF 50+**.

Se recomienda la toma de fotografías, así como la valoración mediante escalas como Crow's Feet Grading Scale y GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale), y encuesta de satisfacción del paciente en cada sesión y 21 días posteriores al finalizar el tratamiento para una evaluación integral de los resultados.

Reconstitución del producto



Agrega los **5 ml** de la **solución de reconstitución** en el vial de las enzimas liofilizadas.



Agita **suavemente** hasta que el líquido esté **homogéneo**.



Extrae el contenido del vial con la **jeringa**.

Si optas por utilizar anestesia, se recomienda la aplicación de lidocaína tópica 20 minutos antes del tratamiento, o bien, puedes agregar 0.5 ml de lidocaína al 2% al volumen final reconstituido.

Casos Clínicos

Specific Periocular



Dr. Simon Ravichandran, Escocia.

Casos Clínicos

Specific Periocular



Dra. Vanessa Duarte, España.

Casos Clínicos

Specific Periocular



Dra. Sandra de Oliveira, España.

Información importante

Recomendaciones

Utilizar todo el producto tras su reconstitución. No almacenar, ni refrigerar.
Evitar el uso de aparatología inmediatamente después de la aplicación.
Los efectos colaterales son muy raros, si se presentan suelen ser leves con síntomas como eritema, picor e inflamación en el sitio de aplicación. Normalmente desaparecen en 72 horas sin tratamiento.
En caso de reacción alérgica tratar con antihistamínicos y en casos graves con corticoides.

Consejos postratamiento

Comenzar con el tratamiento de cuidado en casa (Home Care) la noche de la primera sesión, sustituyendo la rutina habitual nocturna. A partir del siguiente día se puede seguir con la rutina habitual matutina.
Mantener una rutina de limpieza adecuada de la zona tratada.
Utilizar SPF 50+ y retocar cada 4 horas.
Evitar la exposición solar intensa.
No hacer ejercicio intenso el día del tratamiento y evitar la sudoración excesiva.

Contraindicaciones

Embarazo o periodo de lactancia.
Antecedente de alergias a los componentes en la formulación.
Pacientes oncológicos o con enfermedades autoinmunes activas.
Enfermedades como atopia o asma activa.
Infección local o sistémica.
Esperar mínimo 15 días después de la aplicación de alguna vacuna.



pbserum Specific



Proteos Biotech S.L.
Avenida de la Osa Mayor, 4, 28023,
Madrid, España
info@pbserum.com
+34 915 417 001
proteosbiotech.com



pbserum.professionals.com

Material propiedad de pbserum/ Proteos Biotech para uso exclusivo del personal sanitario cualificado.

Queda prohibida la copia, distribución y edición parcial o total de este material por terceros sin el consentimiento previo y expreso de Proteos Biotech, S.L

Todas las fotografías utilizadas han sido facilitadas por los médicos tratantes.

Correo para notificar reacciones adversas, alergias y toda la información relacionada: technosurveillance@pbserum.com

Consulta de información médica: medinfo@proteosbiotech.com.